



Patiënteninformatie

Behandeling met Infliximab (Remicade®)

Inhoud

Inhoud.....	3
Inleiding	3
Werking van Infliximab (Remicade®)	4
Toedieningswijze.....	4
Mogelijke bijwerkingen	5
Vaccinaties.....	5
Zwangerschap	6
Tot slot.....	6
Wie contacteren bij vragen of problemen?	6
Persoonlijke notities/ vragen	7

AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over de behandeling met Infliximab. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of IBD-verpleegkundige.

Werking van Infliximab (Remicade®)

Infliximab is een biologisch geneesmiddel dat behoort tot de anti-TNF blokkers. TNFalfa is een eiwit dat het lichaam in overdreven mate produceert bij inflammatoire darmziekten. Het bevordert de ontsteking, maar helpt ook in de strijd tegen bepaalde infecties. Infliximab onderdrukt het immuunsysteem.

Remicade® bevat het monoklonaal antilichaam Infliximab.

Alvorens u start met Infliximab, zal u gescreend worden op tuberculose. We voeren een tuberculine-test uit en nemen een foto van de longen.

Toedieningswijze

De behandeling met Infliximab is hetzelfde voor Crohn als Colitis Ulcerosa.

Het oplaadschema bestaat uit infusen die u krijgt toegediend op het algemeen dagziekenhuis. Hiervoor wordt u enkele uren opgenomen. De infusen worden toegediend op week 0, week 2, week 6. Als u een goede respons heeft op Infliximab, dan worden de infusen vanaf dan om de 8 weken toegediend.

De dosis van Infliximab wordt berekend op basis van uw lichaamsgewicht en bedraagt 5mg/kg.

Mogelijke bijwerkingen

- Omdat Infliximab het immuunsysteem onderdrukt, bent u meer vatbaar voor infecties. Meestal gaat het om banale infecties zoals, urineweginfecties of bovenste luchtweginfecties.
- In sommige gevallen treedt er huiduitslag zoals psoriasis of eczeem op.
- Hoofdpijn kan na de toediening van het infuus ontstaan. Deze is van voorbijgaande aard en u mag hiervoor een pijnstiller (paracetamol) nemen.
- We raden een jaarlijks nazicht aan bij de dermatoloog aangezien er een licht verhoogde kans is op het ontwikkelen van huidtumoren (melanomen). Daarom is goede zonnebescherming van belang.

Infliximab is een lichaamsvreemd eiwit. Het is dus mogelijk dat u in de loop van de behandeling antilichamen ontwikkelt. Dit kan leiden tot verminderde werking van het geneesmiddel. Om dit goed op te volgen kan de arts de hoeveelheid medicatie in uw bloed controleren (= spiegel bepalen). Belangrijk is dat Infliximab pas **NA DEZE BLOEDNAME** mag toegediend worden, anders is de meting niet correct!

Vaccinaties

Voor dat u start met Infliximab is het belangrijk om weten dat u tijdens de behandeling **geen verzwakte levende vaccins** mag toegediend krijgen: bijvoorbeeld gele koorts, mazelen, bof, rode hond (rubella) en waterpokken (varicella).

Indien één van deze vaccinaties toch noodzakelijk zouden zijn, moet u deze minstens 3 weken voor de aanvang van de behandeling krijgen. Vaccineren mag ook vanaf 3 maanden na het stopzetten van de behandeling.

Omdat deze medicatie het immuunsysteem onderdrukt, raden we volgende vaccinaties wel aan:

- Griepvaccin, jaarlijks
- Pneumokokken vaccin (longontsteking) om de 5 jaar
- Hepatitis A en B
- Tetanus (klem) om de 10 jaar

Zwangerschap

Omdat de beschikbare gegevens erg beperkt zijn, wordt uit voorzorg aanbevolen om Infliximab niet te gebruiken tijdens de 2^{de} helft van de zwangerschap.

Indien er een zwangerschapswens is, bespreek dit dan met uw arts.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de IBD-verpleegkundigen.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

Polikliniek Maag-Darm- en Leverziekten
campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout



2^{de} verdieping, route D50

Afspraken – secretariaat 014/44 44 40

IBD-verpleegkundigen : ibd@azturnhout.be of 014/44 44 37
Wendy Janssens en Kathleen Kokke

De gastro-enterologen:

Dr. Claessens, Dr. Croonen, Dr. Harlet, Dr. Van Roey, Dr. Van Gool,
Dr. T'Syen, Dr. Janssens

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout