



Patiënteninformatie

# Therapie Panitumumab VECTIBIX®

# Inhoud

Inleiding .....	3
Omschrijving van uw therapie panitumumab .....	3
Wat is panitumumab? .....	3
Hoe wordt panitumumab toegediend? .....	3
Waar wordt de therapie toegediend? .....	4
Mogelijke nevenwerking bij panitumumab .....	4
Misselijkheid en Braken .....	4
Verandering van de huid.....	4
Ademhalingsproblemen .....	4
Diarree .....	4
Vermoeidheid .....	5
Wanneer uw arts raadplegen? .....	5
Tot slot.....	6
Wie contacteren bij vragen of problemen? .....	6
Persoonlijke notities / vragen .....	7

*AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.*

## Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over uw therapie PANITUMUMAB. U leest hierin meer over de behandeling zelf, bijzondere richtlijnen en mogelijke nevenwerkingen van de therapie. We geven u tips om met deze nevenwerkingen om te gaan en we zetten op een rij in welke gevallen u de huisarts of de verpleegafdeling moet contacteren.

Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.

## Omschrijving van uw therapie Panitumumab

### Wat is Panitumumab?

Panitumumab blokkeert de groei van bloedvaten die voedingsstoffen en zuurstof naar de tumorcellen brengen. Op die manier kan Panitumumab de groei en de deling van de tumor remmen en verhinderen.

### Hoe wordt Panitumumab toegediend?

Het geneesmiddel Panitumumab wordt toegediend in de vorm van een infuus.

Panitumumab kan ook worden gebruikt in combinatie met chemotherapie.

Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken. U krijgt Panitumumab eenmaal om de 2 weken toegediend.

De duur van uw behandeling met Panitumumab hangt af van het effect van de therapie en hoe u de therapie verdraagt.

## Waar wordt de therapie toegediend?

U zult het geneesmiddel altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Overnachting is dan niet nodig.

## Mogelijke nevenwerking bij Panitumumab

### Misselijkheid en Braken

Misselijkheid en braken kan voorkomen, maar is meestal mild en vrij goed te voorkomen / controleren met medicatie. De klachten kunnen optreden kort na de toediening van de therapie tot enkele dagen na de toediening.

### Verandering van de huid

Uw behandeling kan uw huid droger en/of schilferig maken. Uw huid kan gespannen lijken en roodheid vertonen. Soms kan zich een huidreactie onder de vorm van huiduitslag voordoen, gepaard gaande met ernstige jeuk. Gebruik een hydraterende (vocht-inbrengende) crème op uw armen en benen om een droge huid en jeuk te voorkomen.

### Ademhalingsproblemen

Ademhalingsproblemen kunnen vooral een beangstigend gevoel geven. Contacteer in geval van felle hoestbuien, benauwdheid of ademnood uw arts of meldt u aan op de spoedafdeling. Het is mogelijk dat de arts beslist de dosis aan te passen of de therapie te stoppen.

### Diarree

Panitumumab kan inwerken op de cellen van de darmen. Dit geeft irritatie van het darmslijmvlies waardoor diarree kan voorkomen. Drink voldoende (vooral zoutrijke dranken, bv. bouillon) om uitdroging te voorkomen. Maak diarree eerst bespreekbaar met uw arts voor u medicatie inneemt om de diarree te verminderen of te stoppen.

## Vermoeidheid

Vermoeidheid is geen banale klacht. Spreek erover met uw arts en/of met de verpleegkundigen. Vermoeidheid kan optreden tijdens de eerste week van de behandeling en neemt nadien verder toe. Na het stopzetten van de behandeling zullen de klachten traag verminderen. Het is niet abnormaal dat u nog last hebt van vermoeidheid enkele maanden na het stopzetten van de therapie. Soms kan vermoeidheid nog verschillende jaren na de therapie duren.

## Wanneer uw arts raadplegen?

Contacteer uw arts bij:

- Ernstige ademnood met benauwdheid.
- Diarree die het normale functioneren belemmert.

## Tot slot

De hierboven vermelde bijwerkingen zijn de meest voorkomende bijwerkingen voor deze behandeling. Hoe u deze bijwerkingen beleeft, is erg persoonlijk. Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen weer niet. Aarzel niet uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige te contacteren bij vragen rondom andere bijwerkingen die u ervaart of andere vragen, gevoelens en eventuele onzekerheden.

## Wie contacteren bij vragen of problemen?

Centrum voor oncologie - AZ Turnhout  
Campus Sint-Elisabeth  
Rubensstraat 166, 2300 Turnhout  
Gelijkvloers

Oncologisch dagziekenhuis 014 40 60 01

Oncologie hospitalisatie 014 40 65 00



**AZ Turnhout vzw**  
[www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)  
[info@azturnhout.be](mailto:info@azturnhout.be)



Blijf op de hoogte via [www.facebook.com/azturnhout](https://www.facebook.com/azturnhout)



**Campus Sint-Jozef**  
Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout  
014 40 60 11



**Campus Sint-Elisabeth**  
Rubensstraat 166  
2300 Turnhout  
014 40 60 11