



Patiënteninformatie

Therapie Bevacizumab AVASTIN®

Inhoud

Inhoud	2
Inleiding	3
Omschrijving van uw therapie Bevacizumab	3
Wat is Bevacizumab?	3
Hoe dienen we Bevacizumab toe?	3
Waar krijgt u de therapie?	4
Mogelijke nevenwerking bij Bevacizumab	4
Verhoogde bloeddruk	4
Verhoogd eiwitgehalte in de urine	4
Bloedingen	4
Verstoorde wondgenezing	5
Wanneer uw arts raadplegen?	5
Tot slot	6
Wie contacteren bij vragen of problemen?	6
Persoonlijke notities/ vragen	7

AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over uw therapie Bevacizumab. U leest hierin meer over de behandeling zelf, bijzondere richtlijnen en mogelijke nevenwerkingen van de therapie. We geven u tips om met deze nevenwerkingen om te gaan en we zetten op een rij in welke gevallen u de huisarts of de verpleegafdeling moet contacteren.

Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.

Omschrijving van uw therapie Bevacizumab

Wat is Bevacizumab?

Bevacizumab blokkeert de groei van bloedvaten die voedingsstoffen en zuurstof naar de tumorcellen brengen. Op die manier kan Bevacizumab de groei van de tumor remmen.

Hoe dienen we Bevacizumab toe?

U krijgt het geneesmiddel Bevacizumab via een infuus.

De eerste 2 toedieningen geven we trager omwille van eventuele allergische reacties die kunnen optreden.

Bevacizumab wordt meestal gebruikt in combinatie met chemotherapie. Daarnaast kan uw arts nog enkele andere geneesmiddelen voorschrijven. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

Afhankelijk van de chemotherapie die in combinatie krijgt, geven we u Bevacizumab eenmaal om de 2 of 3 weken. De duur van uw behandeling met Bevacizumab hangt af van het effect van de therapie en hoe u de therapie verdraagt.

Waar krijgt u de therapie?

U krijgt de chemotherapie altijd in het ziekenhuis. De behandeling kan in het daghospitaal gebeuren. Overnachting is dan niet nodig.

Mogelijke nevenwerking bij Bevacizumab

Verhoogde bloeddruk

Door Bevacizumab kunt u last hebben van een verhoogde bloeddruk. Daarom controleren we uw bloeddruk voor en na de toediening van Bevacizumab.

Een verhoogde bloeddruk moeten we verder opvolgen. Mogelijk krijgt u medicatie voorgeschreven tegen verhoogde bloeddruk.

Verhoogd eiwitgehalte in de urine

Door Bevacizumab kan het eiwitgehalte in de urine verhoogd zijn. Daarom controleren we uw urine voor elke toediening.

Bloedingen

Bloedingen van het slijmvlies (vooral neusbloedingen), kunnen optreden bij de toediening van Bevacizumab.

Als u thuis een bloedneus hebt, blijf dan rechtop zitten. Snuit flink uw neus, zodat het meeste bloed eruit is. Daarna knijpt u uw neus vlak onder het neusbeen dicht voor minstens 10 minuten. Buig uw hoofd licht voorover en blijf rustig ademen langs de mond.

Probeer uw neus niet meer te snuiten wanneer het bloeden is gestopt. Door te snuiten maakt u mogelijk het bloedstolsel los waardoor uw neus opnieuw begint te bloeden.

Als u het bloeden niet gestopt krijgt, kunt u best uw arts contacteren. Begin niet zelf met andere maatregelen zoals bijvoorbeeld bloedstelpende watten.

Verstoorde wondgenezing

Bevacizumab kan een normale wondgenezing verstoren. Daarom is het belangrijk dat u eventuele heelkundige ingrepen (bijvoorbeeld aan de tanden) eerst met uw arts bespreekt. Uw arts zal sommige ingrepen tijdens uw behandeling met Bevacizumab afraden.

Om dezelfde reden is het belangrijk dat u eventuele wonden toont aan uw arts of verpleegkundige zodat zij een gepaste verzorging kunnen instellen.

Ook bij plotse en abnormale gewaarwordingen zoals pijn of zwelling is het belangrijk dat u onmiddellijk contact neemt met uw (huis)arts.

Wanneer uw arts raadplegen?

Contacteer uw arts bij:

- Een verhoogde bloeddruk.
- Een bloedneus die niet te stelpen is.
- Ernstige verwondingen, al dan niet met pijn of zwelling.

Tot slot

De hierboven vermelde bijwerkingen zijn de meest voorkomende bijwerkingen voor deze behandeling. Hoe u deze bijwerkingen beleeft, is erg persoonlijk. Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen weer niet. Aarzel niet uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige te contacteren bij vragen rondom andere bijwerkingen die u ervaart of andere vragen, gevoelens en eventuele onzekerheden.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

Centrum voor oncologie - AZ Turnhout
Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166, 2300 Turnhout
Gelijkvloers

Oncologisch dagziekenhuis ☎ 014 40 60 01

Oncologie hospitalisatie ☎ 014 40 65 00

Persoonlijke notities/ vragen

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of verpleegkundige.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11