

Daratumumab



Daratumumab is een monoklonaal antilichaam dat specifieke eiwitten op de myeloomcellen herkent en bindt. Deze binding zorgt voor het afsterven van de cellen en het markeren van de cellen zodat het immuunsysteem deze cel kan vernietigen.



Daratumumab wordt meestal in de vorm van een onderhuidse injectie toegediend. De inspuitingen met daratumumab zullen in uw buik gebeuren.

De verpleegkundige zal de injecties afwisselend op een andere plaats toedienen.

Daratumumab wordt altijd toegediend in combinatie met corticosteroïden en/of andere cel remmende geneesmiddelen.

Uw arts en verpleegkundige bespreken dit met u.

Mogelijke bijwerkingen

- ✓ Remming van de aanmaak van alle bloedcellen: hierdoor verhoogde kans op infecties, bloedarmoede of bloedingen (vb: sneller blauwe plekken, een bloedneus , bloed in urine of stoelgang).
- ✓ Bovenste luchtweginfectie: hoest, loopneus of verstopte neus, kortademigheid.
- ✓ Zenuwschade en/of zenuwpijn in vingertoppen en tenen. Tintelingen en voos gevoel.
- ✓ Diarree of constipatie
- ✓ Vermoeidheid (ook na afloop van de totale behandeling kunnen deze klachten tijdelijk aanhouden)
- ✓ Reactie op de insteekplaats: rode huid, jeuk, zwelling
- ✓ Droge schilferige huid, jeuk, uitslag





Contacteer het behandelend team:

- Als u veel last heeft van bovenvermelde nevenwerkingen
- Bij nieuwe of verergerde longklachten, zoals moeite met ademen, kortademigheid of hoesten met of zonder slijm, of koorts
- Bij tekenen van infectie: koorts boven 38°, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- Bij ongecontroleerde bloedingen
- Dringende vragen over uw therapie
- Abnormale gewichtstoename
- Pijn op de borstkas



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie: