

Trastuzumab



Uw therapie Trastuzumab: geneesmiddel dat zich vasthecht aan bepaalde eiwitten op de wand van de tumorcellen. Hierdoor kan de groei van deze cellen gestopt worden. Deze therapie kan gebruikt worden in combinatie met chemotherapie. U zal deze therapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen.



U zal deze chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen.

Dit kan subcutaan (onderhuids) of intraveneus (via de ader) toegediend worden.

Infuus: eerste toediening gebeurt trager (90 min) de volgende toedieningen duren 30 min

Onderhuidse inspuiting: duurtijd 5 minuten



Richtlijn

Onderzoek hartfunctie: Herceptine kan uw hartspierfunctie en longfunctie aantasten, uw hartfunctie zal vooraf en tijdens de behandeling regelmatig onderzocht worden



Mogelijke interacties

- Alcohol: gedurende 1 dag voor en 2 dagen na de therapie alcohol vermijden
- Pomelmoes, granaatappel of sterfruit
- Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts



Mogelijke bijwerkingen

- Allergische reactie
- Griepachtige verschijnselen
- Diarree
- Vermoeidheid



Contacteer het behandelend team:

- Als u veel last heeft van bovenvermelde nevenwerkingen
- Bij nieuwe of verergerde longklachten, zoals moeite met ademen, kortademigheid of hoesten met of zonder slijm, of koorts
- Bij tekenen van infectie: koorts boven 38°, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- Bij ongecontroleerde bloedingen
- Dringende vragen over uw therapie



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie: