

Braftovi® en Mektovi®



Braftovi®, met encorafenib als werkzame stof, wordt in combinatie met Mektovi®, met binimetinib als werkzame stof, gebruikt voor de behandeling van **een soort huidkanker, melanoom** genoemd, als deze veroorzaakt wordt door een bepaalde genetische verandering (mutatie) en uitgezaaid is naar andere delen van het lichaam of niet chirurgisch kan verwijderd worden.



Braftovi® en Mektovi® binden in kankercellen aan specifieke eiwitten, de zogenaamde proteïnekinasen, om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de groei van de kanker vertraagt of stopt.



Er bestaan 2 soorten **Braftovi®** capsules: capsules met 50 mg en 75 mg encorafenib. De aanbevolen dagelijkse dosis is **450 mg (6 capsules van 75 mg) eenmaal daags**. Van **Mektovi®** bestaat er slechts één soort tabletten die 15 mg binimetinib bevatten. De aanbevolen dagelijkse dosis is **45 mg (3 tabletten) tweemaal daags**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **éénmaal per dag** de aanbevolen hoeveelheid Braftovi® en **tweemaal per dag** de aanbevolen hoeveelheid Mektovi® in, met een half glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... capsules Braftovi® ... mg per keer, éénmaal per dag
 ... mg = ... tablet(ten) Mektovi® 15 mg per keer, tweemaal per dag



Neem Braftovi® en Mektovi® **ALTIJD MET** of **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Als je kiest voor inname met voedsel, neem je best een licht verteerbare, weinig vette maaltijd. Als je kiest voor inname zonder voedsel, doe je dit telkens ten minste 1 uur voor het eten of 2 uur na het eten.

Slik de tabletten en capsules in hun geheel in. Kauw niet op de tabletten of capsules. Maak de tabletten niet fijn en open de capsules niet.



Als je een **dosis van Braftovi®** bent **vergeten** en het duurt nog 12 uur of langer tot je de volgende dosis moet innemen, neem de capsules dan meteen in zodra je eraan denkt. Als het minder dan 12 uur duurt tot je een nieuwe dosis van Braftovi® moet innemen, sla je de vergeten dosis over.

Als je een **dosis van Mektovi®** bent **vergeten** en het duurt nog 6 uur of langer tot je de volgende dosis moet innemen, neem de tabletten dan meteen in zodra je eraan denkt. Als het minder dan 6 uur duurt tot je een nieuwe dosis van Mektovi® moet innemen, sla je de vergeten dosis over. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten capsules of tabletten in te halen.



Tijdens een behandeling met Braftovi® en Mektovi® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** of producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Braftovi® en Mektovi® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Braftovi® en Mektovi® kunnen hartproblemen en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig de werking van je hart controleren en andere onderzoeken uitvoeren.



- Als je problemen met je zicht ervaart door de behandeling met Braftovi® of Mektovi®, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.
- **Drink voldoende** water tijdens je behandeling met Braftovi® en Mektovi®.

Zoals alle geneesmiddelen kunnen ook Braftovi® en Mektovi® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor bij een behandeling met Braftovi® en Mektovi® (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Verminderd aantal rode bloedcellen met vermoeidheid en zwakte tot gevolg
- ✓ Pijn, verlies van gevoel en tintelend gevoel in handen en voeten (perifere neuropathie)
- ✓ Duizeligheid, hoofdpijn
- ✓ Problemen met uw zicht
- ✓ Bloedingen, hoge bloeddruk
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Moeilijke stoelgang (obstipatie) of diarree
- ✓ Buikpijn
- ✓ Jeuk, droge huid, huiduitslag
- ✓ Haaruitval (alopecia)
- ✓ Gewrichts- en spierpijn, pijn in ledematen, rugpijn
- ✓ Koorts
- ✓ Vochtophoping in handen, enkels of voeten (oedeem)



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Braftovi® en/of Mektovi® hebt ingenomen
- ✓ Bij duizeligheid, moeheid, een licht gevoel in het hoofd, kortademigheid, hartkloppingen, onregelmatige hartslag, zwelling van de benen
- ✓ Bij ophoesten van bloed, bloedstolsels, braaksel dat bloed bevat of eruit ziet als 'koffiegruis', stoelgang die bloed bevat of zwarte stoelgang die eruitziet als teer, bloed in de urine, maag- of buikpijn, ongewoon vaginaal bloedverlies, duizeligheid, zwakte
- ✓ Bij wazig zicht, verlies van gezichtsvermogen, andere visusveranderingen (bv. gekleurde stippen in het zicht, wazige randen rond voorwerpen)
- ✓ Bij huidveranderingen tijdens en na de behandeling, incl. een wrat, huidzweer, roodachtig bultje dat bloedt of niet geneest, moedervlek die verandert in grootte of kleur.
- ✓ Bij spierpijn, krampen, stijfheid, spasmen of donkere urine
- ✓ Bij ernstige hoofdpijn, duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, verhoogde bloeddruk
- ✓ Bij pijn op de borst, plotse kortademigheid, moeite met ademen, pijn in benen met/zonder zwelling, zwelling in armen en benen, of een koude, bleke arm of been
- ✓ Bij hoesten, kortademigheid of vermoeidheid



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
 014 40 60 81: klinisch apotheker
 014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum 08/07/2025