

Ibrance® (palbociclib)



Ibrance®, met palbociclib als werkzame stof, wordt gebruikt bij **hormoongevoelige borstkanker**. De behandeling met Ibrance® wordt doorgaans gecombineerd met een geneesmiddel dat de hoeveelheid oestrogeen verlaagt. Dit oestrogeenverlagend geneesmiddel kan je innemen onder de vorm van tabletten, zoals letrozol (Femara®), of kan ingespoten worden in de spieren, zoals fulvestrant (Faslodex®).



Ibrance® bindt in kankercellen aan specifieke eiwitten, de zogenaamde cycline-afhankelijke kinasen 4/6 (CDK 4/6), en blokkeert zo hun werking. Een gevolg hiervan is dat **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor afsterven.

Het oestrogeenverlagend geneesmiddel zorgt ervoor dat je lichaam geen oestrogeen meer aanmaakt. Oestrogeen is een hormoon dat de groei van kankercellen stimuleert in hormoongevoelige kankers. Door de aanmaak van oestrogeen te remmen zullen borstkankercellen niet meer groeien of delen en wordt het effect van Ibrance® versterkt.



Er bestaan 3 soorten Ibrance® tabletten: 75 mg, 100 mg en 125 mg palbociclib. Meestal wordt gestart met een **dagelijkse dosis** van **125 mg**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **éénmaal per dag**, op een vast tijdstip, bij de maaltijd, de aanbevolen hoeveelheid Ibrance® in met een glas water. Ibrance® wordt toegediend per **cyclus van 28 dagen**. Je neemt Ibrance® in gedurende 21 dagen, gevolgd door 7 dagen waarop je **GEEN** Ibrance® inneemt (zie innameschema).

Dosis Ibrance®: ... mg = ... tablet Ibrance® ... mg per dag

- **In combinatie met letrozol (Femara®):**

Letrozol (Femara®) neem je elke dag in.

Dosis letrozol (Femara®): ... mg = ... tablet letrozol (Femara®) 2,5 mg per dag

- **In combinatie met fulvestrant (Faslodex®):**

Cyclus 1: injectie op dag 1 en dag 15; vanaf cyclus 2: injectie op dag 1



Neem Ibrance® **ALTIJD MET voedsel** in, bij voorkeur bij een maaltijd.

Slik de tabletten in hun geheel door met een glas water. Je mag de tabletten **breken, fijnmalen** of erop **kauwen**.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten capsule in te halen.



Tijdens een behandeling met Ibrance® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** of producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Ibrance® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Ibrance® kan de samenstelling van je bloed verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. het aantal bloedcellen te controleren.



Als je je ongewoon moe voelt door de behandeling met Ibrance®, wees dan bijzonder voorzichtig wanneer je een voertuig bestuurt of een machine gebruikt.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Ibrance® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Gedaald aantal witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes
- ✓ Verhoogd risico op infecties
- ✓ Verhoogd risico op bloedingen
- ✓ Vermoeidheid en zwakte
- ✓ Huiduitslag (rash)
- ✓ Haarverlies (alopecia)
- ✓ Pijn en blaasjes of zweertjes in de mond (mondslijmvliesontsteking)
- ✓ Misselijkheid, braken, verminderde eetlust
- ✓ Diarree



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel Ibrance® hebt ingenomen
- ✓ Als je slik- of ademhalingsproblemen ervaart, zwelling van lippen, tong, gezicht of als je ernstige jeuk hebt, gepaard met rode huiduitslag
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), koude rillingen, hoesten, ademhalingsproblemen of een piepende ademhaling, ...
- ✓ Bij bloedingen of wanneer je merkt dat je erg snel blauwe plekken krijgt
- ✓ Bij droge hoest of pijn op de borst, of als je moeite hebt met ademen



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
 014 40 60 81: klinisch apotheker
 014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum 08/07/2025



Innameschema Ibrance®



In combinatie met letrozol (Femara®):

Cyclus 28 dagen																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Ibrance® ... mg																												
Letrozol (Femara®) 2,5 mg																												

In combinatie met fulvestrant (Faslodex®):

Cyclus 1 van .../.../.... tot .../.../....																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Ibrance® ... mg																												
Faslodex®																												

Vanaf cyclus 2 van .../.../....																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Ibrance® ... mg																												
Faslodex®																												