

Doxorubicine



Uw therapie bestaat uit het celremmend geneesmiddel: Doxorubicine. Deze therapie kan gebruikt worden in combinatie met andere chemotherapie. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling om bijvoorbeeld bijwerkingen te beperken.



U zal deze chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. **Doxorubicine** wordt wekelijks of driewekelijks toegediend. Infuus loopt 30 min.

Doxorubicine is roodgekleurd, hierdoor zal uw urine ook gekleurd zijn.

- ✓ **Wekelijks:** één cyclus duurt 7 dagen en omvat één ambulante opname voor chemotherapie. Dag één is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus.
- ✓ **Driewekelijks:** één cyclus duurt 21 dagen en omvat één ambulante opname voor chemotherapie. Dag één is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus.

Mogelijke interacties



- ✓ Alcohol: gedurende 1 dag voor en 2 dagen na de therapie alcohol vermijden
- ✓ Pompelmoes, granaatappel of sterfruit
- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts.



Mogelijke bijwerkingen

- ✓ Remming van de aanmaak van bloedcellen: hierdoor verhoogde kans voor infecties, bloedarmoede (sneller blauwe plekken, bloedneus, bloed in urine of stoelgang).
- ✓ Maag-darm klachten: verminderde eetlust, misselijkheid en braken of diarree
- ✓ Mondslijmvliesontstekingen
- ✓ Verlies van alle lichaamsharen
- ✓ Cardiotoxiciteit
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Huidveranderingen



Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (urine, ontlasting, wondvocht, bloed, traanvocht, transpiratie, sperma, en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten.

Enkele tips:

- ✓ Urine: zittend plassen, toilet doortrekken met bril naar beneden, toilet tweemaal doortrekken.
- ✓ Sperma/ vaginaal vocht: gebruik van condoom bij betrekkingen
- ✓ Braaksel: zelf opruimen of naasten laten opruimen met handschoenen



Contacteer het behandelend team

- ✓ Als je te **veel last** ondervindt van bovenvermelde **nevenwerkingen**
- ✓ Bij tekenen van **infectie**: koorts boven 38°C, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde **bloedingen**
- ✓ Dringende **vragen** over uw therapie



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie: