

Giotrif® (afatinib)



Giotrif®, met afatinib als werkzame stof, wordt gebruikt voor de behandeling van niet-kleincellige **longkanker**. Giotrif® kan enkel gebruikt worden wanneer de kanker veroorzaakt wordt door een specifieke genetische verandering (mutaties in het EGFR-gen) of als de longkanker van het plaveiselceltype is.



Giotrif® bindt in kankercellen aan specifieke eiwitten, de zogenaamde proteïnekinasen, om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Er bestaan 4 soorten Giotrif® tabletten: tabletten met 20 mg, 30 mg, 40 mg en 50 mg afatinib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **40 mg**. Als de nevenwerkingen te veel doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem de aanbevolen hoeveelheid in **op een vast tijdstip éénmaal per dag** met een half glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tablet(ten) Giotrif® ... mg



Neem Giotrif® **ALTIJD ZONDER** voedsel in. Dit betekent dat je Giotrif® moet innemen **ten minste 1 uur vóór of 3 uur na het eten**.

Slik de tablet(ten) in hun geheel door met een half glas water. Je mag de tabletten niet breken, fijnmalen of erop kauwen. Enkel als je moeite hebt met de tablet door te slikken, mag je de tablet oplossen in een half glas plat water. Roer tot de tablet volledig uiteengevallen is (± 15 minuten) en drink direct daarna het glas volledig leeg. Het glas met wat water naspoelen en dit óók opdrinken.



Als je een **dosis** bent **vergeten** en het duurt nog 8 uur of langer tot je de volgende dosis moet innemen, neem de tablet(ten) dan meteen in zodra je eraan denkt. Als het minder dan 8 uur duurt tot je je nieuwe dosis moet innemen, sla je de vergeten dosis over. Ga vervolgens verder volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tablet(ten) in te halen.



Tijdens een behandeling met Giotrif® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** en producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Giotrif® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



- Als je problemen met je zicht ervaart door de behandeling met Giotrif®, wees dan bijzonder voorzichtig als je een voertuig bestuurt of een machine gebruikt.
- Vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht. Draag beschermende kledij en een zonnebrandcrème en lippenbalsem met beschermingsfactor 50+.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Giotrif® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):



- ✓ Verminderde eetlust
- ✓ Mondslijmvliesontsteking (pijn en blaasjes of zweertjes in de mond)
- ✓ Diarree
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Bloedneus
- ✓ Huiduitslag (rash), droge huid, jeuk
- ✓ Nagelinfecties

Contacteer het behandelend team :



- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Giotrif® hebt ingenomen
- ✓ Als je huiduitslag krijgt (vroegtijdige behandeling is belangrijk): blaas-, blaar- en schilfervorming
- ✓ Als je diarree krijgt (vroegtijdige behandeling is belangrijk)
- ✓ Als je kortademig wordt of de kortademigheid plots verergert, eventueel gepaard met hoesten of koorts
- ✓ Als je plots een rood en pijnlijk oog krijgt of dit plots verergert, als je oog meer gaat tranen, als je wazig ziet of als je overgevoelig wordt voor licht

Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.

