

Anagrelide

Xagrid®, Atremia® en generieken



Xagrid®, Atremia® en generieken met als werkzame stof anagrelide, worden gebruikt om **essentiële trombocytose** te behandelen. Essentiële trombocytose is een aandoening waarbij het beenmerg een teveel aan specifieke bloedcellen - de bloedplaatjes - aanmaakt. Anagrelide wordt voorgeschreven wanneer de bestaande therapie niet goed wordt verdragen of niet voldoende werkt om het verhoogd aantal bloedplaatjes naar het normale niveau te verlagen.



Anagrelide onderdrukt de aanmaak van bloedplaatjes. Het gevolg hiervan is dat het aantal bloedplaatjes in het lichaam zal verlagen. Wanneer er te veel bloedplaatjes in het lichaam aanwezig zijn, kan dat immers voor bloedklonters zorgen.



Elke capsule Anagrelide bevat 0,5 mg Anagrelide. Meestal wordt gestart met een **dagelijkse dosis van 0,5 mg tweemaal per dag** die je gedurende ten minste één week moet innemen. Na die tijd kan de arts een hogere of lagere dosis Anagrelide voorschrijven om de geschikte dosis te vinden die je aantal bloedplaatjes het best op het gewenste aantal brengt.



Neem **tweemaal per dag, op een vast tijdstip** de aanbevolen dosis in met een glas water. Dagelijkse dosis: ... mg = ... capsule(s) Anagrelide 0,5 mg per keer, tweemaal per dag



Neem Anagrelide **ALTIJD MET of ALTIJD ZONDER** voedsel in. Slik de capsules **in hun geheel** door met een glas water. Je mag de capsules **niet openen, niet fijnmalen of erop kauwen**.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem je deze in zodra je eraan denkt. Ga de volgende dag verder volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten capsule(s) in te halen.



Anagrelide geeft een wisselwerking met andere middelen, meld daarom tijdens je behandeling met Anagrelide steeds aan je arts of apotheker welke **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** je inneemt of overweegt in te nemen.



Je arts zal de werkzaamheid van Anagrelide controleren door regelmatig een bloedafname te doen om het aantal bloedcellen te controleren. Daarnaast zal de arts je lever-, hart- en nierfunctie opvolgen en de elektrolyten (kalium, magnesium en calcium) in je bloed bepalen.



- Als je je duizelig, voelt door de behandeling met Anagrelide, wees dan bijzonder voorzichtig wanneer je een voertuig bestuurt of een machine gebruikt.
- Stop niet zomaar met de behandeling maar doe dit enkel op advies van je behandelende arts.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Anagrelide nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Hoofdpijn

Volgende **nevenwerkingen** komen **vaak** voor (bij meer dan 1/100 patiënten en minder dan 1/10 patiënten)

- ✓ Duizeligheid
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Snelle hartslag, hartkloppingen
- ✓ Misselijkheid, braken
- ✓ Diarree
- ✓ Buikpijn, winderigheid (flatulentie)
- ✓ Bloedarmoede (anemie)
- ✓ Zwelling van handen en voeten (oedeem)
- ✓ Huiduitslag (rash)



Contacteer het behandelend team bij het optreden van volgende tekenen:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Anagelider hebt ingenomen
- ✓ Bij kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van de benen door vochtophoping, hartkloppingen of onregelmatige of versnelde hartslag
- ✓ Als je pijn in de buik en rug hebt, bloed braakt of bloederige of zwarte ontlasting hebt
- ✓ Bij blauwe plekken, abnormale zwakte en bloedingen
- ✓ Als je weinig of niet kunt plassen
- ✓ Bij kortademigheid, zwelling in benen of enkels, blauwe verkleuring van je lippen en je huid



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.

