



Patiënteninformatie

Ixekizumab

Voorgeschreven door de reumatoloog

Inhoud

Inleiding	4
Werking van ixekizumab	4
Wanneer wordt ixekizumab voorgeschreven?	4
Vorbereiding.....	4
Het gebruik van ixekizumab	5
Hoeveel ixekizumab wordt er gegeven en hoelang?	5
Hoe bewaar ik ixekizumab?	5
Controle	5
Bijwerkingen van ixekizumab	6
Zwangerschap en borstvoeding	6
Vaccinaties.....	6
Alcohol	7
Autorijden.....	7
Reisadvies	7
Zonlicht	7
Operaties	8
Gebruik van ixekizumab samen met andere medicijnen.....	8
Behandelingsschema	9
Injectieschema	10
Tot slot	11

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u ixekizumab gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze brochure voor de afspraak hebt doorgelezen. Als u nog vragen hebt, kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking van ixekizumab

Ixekizumab is een reumabestrijdend middel en behoort tot de zogenaamde bDMARDs (biological Disease Modifying Antirheumatic Drugs) ofwel “ziekteverloop beïnvloedende geneesmiddelen tegen reuma” .

Ons lichaam bevat verschillende eiwitten. Eén daarvan is IL-17A. IL-17A kan ervoor zorgen dat een ontsteking ontstaat en blijft bestaan. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er teveel IL-17A. Het medicijn secukinumab blokkeert de werking van IL-17A. Hierdoor verminderen de ontstekingsklachten.

Ixekizumab kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afneemt en uw gewrichten op de lange termijn minder schade oplopen.

Wanneer wordt ixekizumab voorgeschreven?

Ixekizumab kan voorgeschreven worden aan patiënten met een reumatische aandoening (zoals psoriasis arthritis) waarbij andere medicijnen onvoldoende helpen, ook patiënten met psoriasis krijgen dit voorgeschreven.

Vorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling met ixekizumab moet onderzocht worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is.

Dit houdt onder andere in dat onderzocht wordt of u een tuberculose-infectie of hepatitis hebt of hebt gehad.

Het gebruik van ixekizumab

Ixekizumab wordt via onderhuidse injectie gegeven. U leert hoe u dit zelf kunt doen (met een zogenaamde voorgevulde prikpen of spuit).

Hoeveel ixekizumab wordt er gegeven en hoelang?

Uw arts beslist hoeveel ixekizumab u nodig heeft en hoelang.

Elke patiënt heeft eenzelfde opstart dosis van 1x 2 onderhuidse injecties van 80 mg.

Verdere behandeling:

Voor patiënten met psoriasis arthritis is de standaard aanbevolen dosis 80 mg via onderhuidse injectie 1x per 4 weken.

Voor patiënten met psoriasis arthritis die ook matige tot ernstige plaque psoriasis hebben, is de aanbevolen dosis 80 mg via onderhuidse injectie 1x per 2 weken.

Hoe bewaar ik ixekizumab?

Bewaar dit medicijn in de koelkast (2-8°C). Laat deze vóór toediening eerst 30 min op kamertemperatuur komen.

Controle

Tijdens de behandeling wordt regelmatig bloed bij u afgenomen. Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie gecontroleerd.

De eerste 3 tot 6 maanden van de behandeling wordt u regelmatig gecontroleerd om te kijken of u het medicijn goed verdraagt en of het voldoende werkt bij u.

Bijwerkingen van ixekizumab

Hieronder worden de meest voorkomende bijwerkingen beschreven:

Allergische reacties kunnen optreden na gebruik met ixekizumab. U kunt dan last hebben van: hoofdpijn, misselijkheid, huiduitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden en bloeddrukverhoging of verlaging.

Klachten van de huid op de plaats waar de injectie wordt toegediend. Denk aan roodheid, zwelling, jeuk, blauwe plekken of pijn. Dit is vrij altijd mild en vermindert meestal in de loop van de behandeling.

Wij adviseren u om de injectieplaats af te wisselen. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met de reumaverpleegkundige.

Bijwerkingen van organen: bijwerkingen die u zelf niet merkt maar uw arts via bloedonderzoek wel in de gaten houdt. Het gaat om leverfunctietests, nierfunctietests en afwijkingen in het bloedbeeld.

Ixekizumab maakt u vatbaarder voor infecties. Neem daarom uw temperatuur op als u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie (bv. ter hoogte van de luchtwegen, een schimmelinfectie) contact op met uw huisarts of reumatoloog en wacht met de injectie.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de gevolgen van het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding. Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

Niet zomaar elk vaccin mag toegediend worden aan patiënten die behandeld worden met ixekizumab. Het griepvaccinatie en pneumokokken vaccinatie worden aanbevolen.

Bespreek dit met uw huisarts. We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Alcohol

Er is geen bezwaar als u (matig) alcohol gebruikt tijdens behandeling met ixekizumab.

Autorijden

Ixekizumab zelf veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens gebruik van ixekizumab.

Reisadvies

Wij raden u af om bij gebruik van ixekizumab naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen.

Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

Deze medicatie moet koel bewaard worden tussen +2°C en +8°C en mag in geen geval getransporteerd worden in de bagageruimte van het vliegtuig.

Neem daarom een reisdocument mee waarop uw arts meldt dat u behandeld moet worden met ixekizumab onder de vorm van een voorgevulde pen (of spuit) en dat het daarom noodzakelijk is om dit geneesmiddel mee te nemen in uw handbagage.

Zonlicht

Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV –straling tijdens het gebruik van ixekizumab. Uw huid is gevoeliger voor de zon.

Draag beschermende, liefst katoenen, kleding en gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).

Maak liever geen gebruik van de zonnebank.

Operaties

Als u geopereerd moet worden, overleg dan tijdig met uw reumatoloog.

Gebruik van ixekizumab samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts over uw behandeling met ixekizumab.

Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Vertel uw apotheek ook altijd dat u ixekizumab gebruikt.

Behandelingschema

Artritis psoriatica

1^{ste} injectie op startdatum: (2 injecties)

2^e injectie week 4:.....

3^e injectie week 8:.....

4^e injectie week 12:.....

Volgende periodes van terugbetaling: Toedieningen 1x per 4 weken.

Artritis psoriatica met gelijktijdig matige tot ernstige plaque psoriasis

1^{ste} injectie op startdatum: (2 injecties)

2^e injectie week 2:.....

3^e injectie week 4:.....

4^e injectie week 6:.....


5^e injectie week 8:

6^e injectie week 10:

7^e injectie week 12:

Volgende periodes van terugbetaling: toedieningen 1x per 4 weken.

Injectieschema



Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kan u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bellen met de polikliniek van **08u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00** op het nummer **014/44 43 72**.

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

- www.bcfi.be
- <http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout