



Patiënteninformatie

Ixekizumab

Voorgeschreven door de reumatoloog

Inhoud

Inhoud	3
Inleiding.....	5
Werking van ixekizumab	5
Wanneer wordt ixekizumab voorgeschreven?	5
Vorbereiding.....	6
Het gebruik van ixekizumab.....	6
Hoe bewaar ik ixekizumab?	6
Controle	7
Bijwerkingen van ixekizumab.....	7
Zwangerschap en borstvoeding.....	8
Vaccinaties.....	8
Alcohol	8
Autorijden.....	8
Reisadvies	9
Zonlicht	9
Operaties	9
Gebruik van ixekizumab samen met andere medicijnen	10
Behandelingsschema.....	10
Injectieschema	11

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u ixekuzimab gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn.

U hebt nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze brochure voor de afspraak hebt gelezen. Als u nog vragen hebt, kan u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking van ixekizumab

Ixekizumab is een reumabestrijdend middel en behoort tot de zogenaamde bDMARD (biological Disease Modifying Antirheumatic Drug). Het is een geneesmiddel dat het ziektebeloop van reuma beïnvloedt.

Ons lichaam bevat verschillende eiwitten. Eén daarvan is interleukine (IL)-17. Ixekizumab is een menselijk antilichaam tegen het eiwit interleukine (IL)-17. Interleukine (IL)-17 kan een rol spelen bij het ontstaan van ontstekingen en schade aan de gewrichten. Ixekuzimab vermindert de activiteit van interleukine (IL)-17 en remt het ontstekingsproces.

Ixekuzimab helpt u bij:

- pijn, stijfheid en zwelling in uw gewrichten
- vermoeidheid
- vertraagt schade aan het bot en kraakbeen in de gewrichten

Wanneer wordt ixekizumab voorgeschreven?

Ixekuzimab helpt bij de behandeling van volwassenen met psoriasis arthritis en axiale spondyloartropathie, als een eerdere behandeling niet goed genoeg werkte of niet verdragen werd.

Vorbereiding

Voor de behandeling met ixekuzimab onderzoeken we of u in aanmerking komt voor de behandeling en of deze veilig is voor u. Dit houdt onder andere in dat we onderzoeken of u een TBC-infectie of hepatitis hebt of hebt gehad.

Het gebruik van ixekizumab

U krijgt ixekuzimab via onderhuidse injecties (met spuit of prikpen). U leert hoe u dit zelf kunt doen.

- De eerste 1 injectie is een zogenaamde oplaaddosis van 1x 2 onderhuidse injecties van 80 mg.
- Voor patiënten met psoriasis arthritis en axiale spondyloartropathie is de standaard aanbevolen dosis 80 mg via onderhuidse injectie 1x per 4 weken.
- Voor patiënten met psoriasis arthritis die ook matige tot ernstige plaque psoriasis hebben, is de aanbevolen dosis 80 mg via onderhuidse injectie 1x per 2 weken.

Ixekuzimab kan al na 4 weken werken. Het duurt enkele weken voordat er voldoende resultaat is bereikt.

Ixekuzimab kan u alleen of samen met andere geneesmiddelen gebruiken, zoals methotrexaat.

Hoe bewaar ik ixekizumab?

Bewaar dit medicijn:

- in de originele verpakking (ter bescherming tegen licht)
- in de koelkast (2°C - 8°C)

Laat het medicijn vóór toediening eerst 30 minuten op kamertemperatuur komen.

Controle

Tijdens de behandeling met ixekuzimab nemen we regelmatig bloed bij u. Zo kunnen we uw rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie controleren.

De eerste 3 tot 6 maanden van de behandeling controleren we u regelmatig. We kijken dan telkens na of u het medicijn goed verdraagt en of het voldoende werkt.

Bijwerkingen van ixekizumab

Sommige patiënten die ixekuzimab nemen, krijgen last van deze bijwerkingen:

- Patiënten die ixekuzimab gebruiken, zijn vatbaarder voor **infecties**.
 - Meet daarom uw temperatuur wanneer u zich ziek voelt.
 - Contacteer uw huisarts of reumatoloog als u koorts heeft of bij andere tekenen van infectie (bijvoorbeeld ter hoogte van de luchtwegen, een pussend wondje, ...).
- Bijwerkingen van **organen**: dit zijn bijwerkingen die u zelf niet merkt. Uw arts kijkt dit na via bloedonderzoek. Het gaat om afwijkingen in het bloedbeeld, levertesten, nierfunctie.
- **Allergische reacties**: U kunt dan last hebben van: hoofdpijn, misselijkheid, huiduitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden en bloeddrukverhoging of verlaging.
- Milde klachten van de **huid** op de plaats van de inspuiting zoals roodheid, zwelling, jeuk, blauwe plekken of pijn. Wij raden daarom aan om de plaats van inspuiting af te wisselen.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over de invloed van ixekuzimab op vruchtbaarheid en zwangerschap.

- Heeft u een kinderwens? Bespreek dit met uw reumatoloog.
- U mag ixekuzimab niet gebruiken als u zwanger bent.
- U mag ixekuzimab niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit geneesmiddel overgaat in de moedermelk.

Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met de reumatoloog.

Vaccinaties

Patiënten die ixekuzimab gebruiken, mogen niet zomaar elk vaccin krijgen.

- We raden aan om u te laten vaccineren tegen pneumokokken en jaarlijks tegen griep.
- Andere vaccinaties moet u bespreken met uw huisarts of reumatoloog.

Alcohol

U mag (matig) alcohol drinken tijdens behandeling met ixekizumab.

Autorijden

U mag autorijden tijdens gebruik van ixekizumab.

Reisadvies

Wij raden u af om bij gebruik van ixekuzimab naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

U moet de inspuitingen bewaren tussen +2°C en +8°C. De inspuitingen mogen niet getransporteerd worden in de bagageruimte van het vliegtuig. Gebruik een koeltasje bij het vervoeren van ixekuzimab in uw handbagage.

Neem een actueel overzicht van uw medicijnen mee op reis (het medicijnpaspoort). Daarin staat dat u ixekuzimab met bijbehorende injectiespuiten gebruikt op voorschrift van uw arts. U kan een medicijnpaspoort vragen bij uw apotheek of eventueel bij uw arts.

Zonlicht

Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV-straling tijdens het gebruik van ixekizumab. Uw huid is gevoeliger voor de zon.

Draag beschermende kleding en gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).

Operaties

Heeft u een operatie gepland? Bespreek dit vooraf met uw reumatoloog.

- Meestal kunt u doorgaan met het nemen van ixekuzimab.
- Er kan een verhoogd risico op infecties zijn na een operatie en een vertraagde wondgenezing als u ixekuzimab gebruikt.
- Als u diabetes heeft of bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met een arts of u vooraf een antibioticakuur moet krijgen.

Gebruik van ixekizumab samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts en apotheek over uw behandeling met ixekizumab. Het is niet altijd veilig om verschillende medicijnen te combineren. Vertel uw huisarts, tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u al gebruikt. Denk hierbij ook aan het eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Behandelingschema

Artritis psoriatica

1^{ste} injectie op startdatum: (2 injecties)

2^e injectie week 4:.....

3^e injectie week 8:.....

4^e injectie week 12:.....

Volgende periodes van terugbetaling: Toedieningen 1x per 4 weken.

Artritis psoriatica - gelijktijdig matige tot ernstige plaque psoriasis

1^{ste} injectie op startdatum: (2 injecties)

2^e injectie week 2:.....

3^e injectie week 4:.....

4^e injectie week 6:.....

5^e injectie week 8:

6^e injectie week 10:

7^e injectie week 12:

Volgende periodes van terugbetaling: toedieningen 1x per 4 weken.

Injectieschema

Diagram illustrating the locations for intramuscular injections in a human body:

- Buik rechts** (Right Abdomen): Purple box
- Buik links** (Left Abdomen): Red box
- Dij rechts** (Right Thigh): Orange box
- Dij links** (Left Thigh): Green box

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kan u op maandag tot en met donderdag bellen met de polikliniek **van 08u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u30** op het nummer **014 44 43 72**.

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

- www.bcfi.be
- <http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout