

# Bortezomib



Uw therapie bestaat uit een geneesmiddel dat de afbraak van eiwitten in de cel verstoort: Bortezomib. Zo ontstaat er een overaanbod aan beschadigde / overbodige eiwitten in de cel, waardoor de kankercellen afsterven.



## Toediening

Bortezomib wordt meestal in de vorm van een onderhuidse injectie toegediend. De inspuitingen met bortezomib zullen in uw dij of buik gebeuren. De verpleegkundige zal de injecties afwisselend op een andere plaats toedienen.

Bortezomib wordt altijd toegediend in combinatie met corticosteroïden en/of andere cel remmende geneesmiddelen.

Uw arts en verpleegkundige zullen dit met u bespreken.



## Mogelijke interacties

- ✓ Pompoelmoes, granaatappel of sterfruit vermijden.
- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts.



## Mogelijke bijwerkingen

- ✓ Remming van de aanmaak van bloedcellen: hierdoor verhoogde kans voor infecties, bloedarmoede of bloedingen (vb: sneller blauwe plekken, bloedneus, bloed in urine of stoelgang).
- ✓ Zenuwschade en/of zenuwpijn in vingertoppen en tenen. Tintelingen of voos gevoel
- ✓ Diarree of constipatie
- ✓ Smaakverandering en verminderde eetlust
- ✓ Spier- en gewrichtspijn
- ✓ Vermoeidheid (ook na afloop van de totale behandeling kunnen deze klachten tijdelijk aanhouden)
- ✓ Tijdelijke huiduitslag
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Vochtophoping



**Contacteer het behandelend team:**

- Als u veel last heeft van bovenvermelde nevenwerkingen
- Bij nieuwe of verergerde longklachten, zoals moeite met ademen, kortademigheid of hoesten met of zonder slijm of koorts
- Bij tekenen van infectie: koorts boven 38°, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- Bij ongecontroleerde bloedingen
- Dringende vragen over uw therapie
- Abnormale gewichtstoename
- Pijn op de borstkas



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie: