

Instructies bloedverduunners

Informatie voor de patiënt

(Door verwijzende arts aan te duiden wat van toepassing is)

☐ LMWH	Clexane®, Fraxiparine®, Fraxodi®	Ten laatste 24 uur vóór de procedure stoppen indien therapeutisch (hoge dosis) Ten laatste 12 uur vóór de procedure stoppen indien profylactisch (lage dosis en slechts 1x/d)
☐ DOAC	☐ Eliquis® (Apixaban), Xarelto® (Rivaroxaban), Lixiana® (Edoxaban)	2 dagen vóór de procedure stoppen
	☐ Pradaxa® (Dabigatran)	3 dagen stoppen bij normale nierfunctie, 4 dagen stoppen bij verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 50)
☐ Coumarines	☐ Marevan® : 7 dagen vóór de procedure stoppen	Tijdelijk vervangen door spuitjes met LMWH (Clexane, Fraxiparine), te starten 2d. na stop van de Coumarine (bloedverdunner) en stoppen met de spuitjes 24h vóór de infiltratie. Een voorschrift voor deze medicatie alsook voor thuisverpleging werden meegegeven.
	☐ Marcoumar® : 9 dagen vóór de procedure stoppen	
	☐ Sintrom® : 4 dagen vóór de procedure stoppen	
☐ NSAID	Aspirine (Cardioaspirine® , Asaflow®) Dipyridamole	Moeten niet gestopt worden
☐ P2Y12	☐ Ticlid® (Ticlopidine)	10 dagen vóór de procedure stoppen → tijdelijk vervangen door Asaflow 80 mg/dag
	☐ Efient® (Prasugrel), Plavix® (Clopidogrel),	7 dagen vóór de procedure stoppen → tijdelijk vervangen door Asaflow 80 mg/dag
	☐ Brilique® (Ticagrelor)	5 dagen vóór de procedure stoppen → tijdelijk vervangen door Asaflow 80 mg/dag

- Opmerking 1 Bij twijfel raden we aan contact op te nemen met de behandelende arts die deze anticoagulantia heeft voorgeschreven of met het pijncentrum (tel. 014 / 44 42 71)
- 2 De eerste maand na plaatsen van een coronaire stent moet Plavix – Ticlid verder gezet worden en moet de procedure uitgesteld worden.

Anesthesie-Reanimatie

Turnhout,
Handtekening