

CVP (Cyclofosfamide – Vincristine – Prednisone)



De therapie bestaat uit 2 verschillende celremmende geneesmiddelen (cytostatica): Vincristine en Cyclofosfamide. Prednisone is geen cytostaticum. Het is een corticosteroïd en maakt ook deel uit van uw behandeling.

Daarnaast kan uw arts nog andere geneesmiddelen voorschrijven. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.



Het schema hieronder geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 3 weken (21 dagen) en omvat 1 opname voor chemotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 of 4 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en uw algemene toestand dit toelaten.

Voor de eerste toediening nemen we u één nacht in het ziekenhuis op, op de hospitalisatie afdeling oncologie. U zult de verdere chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen op het oncologische dagziekenhuis. Overnachting is dan niet nodig.

Naam product	Wanneer?	Wijze van toediening
Cyclofosfamide	Dag 1	Infuus over 30 min
Vincristine	Dag 1	Infuus over 10 min
Prednisone	Dag 1 tem 5	1 capsule per dag

Richtlijnen:

- ✓ Cyclofosfamide kan klachten geven die lijken op een blaasontsteking. We raden u aan om voldoende te drinken (1,5 tot 2 liter per dag) tijdens en tot 48 uur na de toediening van de chemotherapie. Zo kan u alle schadelijke stoffen uitsplassen.

Mogelijke interacties

- ✓ Alcohol: vermijd alcohol gedurende 1 dag voor en tot en met 2 dagen na de therapie.
- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan uw arts.





Zoals elk geneesmiddel kan ook CVP nevenwerkingen hebben. Niet elke patiënt krijgt hier last van. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Remming van de aanmaak van bloedcellen: hierdoor verhoogde kans voor infecties, bloedarmoede, sneller blauwe plekken en/of een bloedneus.
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Verminderde eetlust
- ✓ Tijdelijke smaakveranderingen
- ✓ Mondslijmvliesontstekingen (bv. aften)
- ✓ Buikloop of diarree
- ✓ Verstopping
- ✓ Ongewone vermoeidheid
- ✓ Haarverlies of dunner wordende haren
- ✓ Tintelingen of voos gevoel in de vingertoppen
- ✓ Invloed op seksualiteit en intimiteit



Extra info omgaan met uitscheiding (urine, ontlasting, wondvocht, bloed, traanvocht, transpiratie, sperma en braaksel)

- ✓ Uw uitscheiding bevat lichte sporen van chemotherapie.

Enkele tips:

- ✓ Urine: zittend plassen, wc tweemaal doorspoelen
- ✓ Sperma / vaginaal vocht: gebruik van condoom bij het vrijen
- ✓ Braaksel: draag handschoenen bij het opruimen



Contacteer het behandelend team :

- ✓ Als u veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Bij nieuwe of verergerde longklachten, zoals moeite met ademen, kortademigheid of hoesten met of zonder slijm, of koorts
- ✓ Bij tekenen van infectie: koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde bloedingen
- ✓ Dringende vragen over uw therapie

Kom onmiddellijk naar spoedgevallen bij koorts vanaf 38°C.



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie.