

RITUXIMAB



Rituximab is een monoklonaal antilichaam. Dit zijn eiwitten die zich binden aan een specifieke cel. In dit geval is dat een soort witte bloedcel.

Deze binding zorgt voor het afsterven van de cellen.



Toediening

Rituximab wordt vaak gebruikt in combinatie met chemotherapie.

- ✓ Toediening kan gebeuren onder de vorm van een infuus of subcutane inspuiting.
- ✓ De toedieningstijd is afhankelijk van de wijze van toediening.



Mogelijke interacties

- ✓ Alcohol: gedurende 1 dag voor en 2 dagen na de therapie alcohol vermijden
- ✓ Pompelmoes, granaatappel of sterfruit vermijden
- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts.



Mogelijke nevenwerkingen

- ✓ Allergische reactie (tijdens toediening van infuus)
- ✓ Mogelijke schommeling van de bloeddruk (regelmatige controles)



Vrouwen tijdens de vruchtbare periode mogen niet zwanger worden!



Contacteer het behandelend team

- ✓ Als je te **veel last** ondervindt van bovenvermelde **nevenwerkingen**
- ✓ Bij tekenen van **infectie**: koorts boven 38°C, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde **bloedingen**
- ✓ Dringende **vragen** over uw therapie



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie: