

Nivolumab



Nivolumab is een **immunotherapie**, deze kan gecombineerd worden met andere immuuntherapie. Deze behandeling **activeert het afweersysteem** zodat de eigen afweercellen de kanker aanvallen



Het schema hieronder toont het verloop van één cyclus van de therapie. Één cyclus duurt 14 of 28 dagen. Naargelang je langer in je behandeling bent en de medicatie goed verdraagt kan dit wijzigen.

Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 14 of 28 dagen na dag 1, als de bloedsuitslagen en uw algemene toestand dit toelaten.

De toediening gebeurt steeds via het oncologisch dagziekenhuis. Als alles goed verloopt kan dan na het toedienen van de therapie naar huis.

Naam	Dag	Wijze van toediening
Nivolumab (14d)	1	Infuus over 30 min
Nivolumab (28d)	1	Infuus over 60 min



Richtlijnen:

We raden u aan om voldoende te drinken (1,5 tot 2l per dag) tijdens en tot 48 uur na de toediening.

Veel immunotherapie producten kunnen de huid gevoeliger maken voor zonlicht.

- ✓ Gebruik steeds beschermende kledij, een hoofddeksel en een zonnecrème met hoge beschermingsfactor.

Mogelijke interacties

- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan uw arts.





Immunotherapie stimuleert het afweersysteem. Dit kan ervoor zorgen dat het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt. Dat kan zich uiten onder de vorm van klachten die op het eerste zicht onschuldig lijken zoals jeuk, Diarree of buikpijn. Toch is het belangrijk dat u deze klachten tijdig meldt

Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ **Huidproblemen:** jeuk, uitslag
- ✓ **Leverproblemen:** geel worden, jeuk, donkere stoelgang, minder eetlust
- ✓ **Maag-darmklachten:** diarree, bloed bij stoelgang, buikpijn, misselijkheid, braken
- ✓ **Longproblemen:** kortademig, hoesten, pijn borstkas
- ✓ **Nierproblemen:** pijn bij het plassen, kleine hoeveelheden plassen
- ✓ **Minder bloedcellen:** bloedarmoede, tekort bloedplaatjes, tekort witte bloedcellen
- ✓ **Vermoeidheid**
- ✓ **Verhoogd suikergehalte in het bloed:** meer honger of dorst, gewichtsverlies, frequent plassen
- ✓ **Problemen andere organen:** verandering zicht, spierpijn, ontsteking zenuw, zwakte in armen of benen
- ✓ **Infuusreactie:** kortademigheid, duizelig, huiduitslag, koorts



Extra info omgaan met uitscheiding (urine, ontlasting, wondvocht, bloed, traanvocht, transpiratie, sperma en braaksel)

U hoeft geen rekening te houden met besmette uitscheidingsproducten.



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als u veel last heeft van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts boven 38°, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde bloedingen
- ✓ Dringende vragen over uw therapie



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie.