

Orserdu® (elacestrant)



Orserdu®, met **elacestrant** als werkzame stof, wordt gebruikt voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen en mannen, met oestrogeenreceptor (ER)-positieve, HER2-negatieve, lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker met een activerende ESR1-mutatie.



Elacestrant remt de **oestrogeen** afhankelijke en -onafhankelijke groei van borstkankercellen, waardoor de cellen in aantal verminderen en celdood ondergaan.



Er bestaan 2 soorten Orserdu® tabletten: tabletten met 345 mg en 86 mg elacestrant.

De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **345 mg eenmaal per dag**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verlagen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem de aanbevolen dosis **eenmaal per dag** in **op een vast tijdstip met een lichte maaltijd**, met een glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tablet(ten) Orserdu® ... mg per keer, eenmaal per dag



Neem Orserdu® **ALTIJD MET** voedsel in, met een lichte maaltijd. Slik de tabletten Orserdu® in hun geheel door. Je mag **niet** op de tabletten kauwen, de tabletten breken of pletten.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, kan de vergeten dosis binnen de 6 uur nog ingenomen worden. Indien je dit meer dan 6 uur na de gebruikelijke inname ontdekt, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema.

Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tablet(ten) in te halen.



Tijdens een behandeling met Orserdu® is het **gebruik** van **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** of producten op basis van **Sint-Janskruid** ten sterkste **afgeraden**.

Als je tijdens je behandeling met Orserdu® nog **andere medicatie, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Als je last hebt van vermoeidheid, slapeloosheid door de behandeling met Orserdu®, wees dan bijzonder voorzichtig wanneer je een voertuig bestuurt of een machine gebruikt.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Orserdu® bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Misselijkheid, braken, constipatie, buikpijn, diarree, maagklachten
- ✓ Verhoogde leverwaarden en cholesterol
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Calcium verlaagd
- ✓ Rugpijn, gewrichtspijnen
- ✓ Verlaagd natrium of kalium
- ✓ Hoofdpijn
- ✓ Opvliegers
- ✓ Anemie



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je teveel van Orserdu® hebt ingenomen
- ✓ Bij hartkloppingen of pijn op de borst
- ✓ Bij gevoel van flauwvallen, benauwdheid, bleekheid, zweten
- ✓ Bij zwelling of pijn in de benen
- ✓ Bij opeens ontstaan van kriebelhoest, ophoesten van bloed of slijmen



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.

