

Taxotere® (Docetaxel)



Uw therapie bestaat uit het celremmend middel: Docetaxel. Deze therapie kan gebruikt worden in combinatie met andere chemotherapie. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling om bijvoorbeeld bijwerkingen te beperken.



U zal deze chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. Docetaxel kan wekelijks, 2-wekelijks of 3-wekelijks worden toegediend.

- ✓ **Wekelijks:** één cyclus duurt zeven dagen en omvat één ambulante opname voor chemotherapie. Dag één is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus.
- ✓ **Tweewekelijks:** één cyclus duurt 14 dagen en omvat één ambulante opname voor chemotherapie. Dag één is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus
- ✓ **Driewekelijks:** één cyclus duurt 21 dagen en omvat één ambulante opname voor chemotherapie. Dag één is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus.

Mogelijke interacties



- ✓ Alcohol: gedurende 1 dag voor en 2 dagen na de therapie alcohol vermijden
- ✓ Pomelmoes, granaatappel of sterfruit
- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts



Mogelijke bijwerkingen

- ✓ Remming van de aanmaak van bloedcellen: hierdoor verhoogde kans op infecties, bloedarmoede, (VB: sneller blauwe plekken, bloedneus, bloed in urine of stoelgang)
- ✓ Maag-darm klachten: verminderde eetlust, misselijkheid en braken of diarree
- ✓ Verlies van alle lichaamsharen
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Oogirritatie
- ✓ Droge huid of huidverkleuring
- ✓ Nagelbeschadiging
- ✓ Allergische reactie zoals kortademig, jeuk, rillingen, beklemmend gevoel borst



Aandachtspunten

- ✓ **Gebruik van nagellak** : Deze doorzichtige nagellak wordt gebruikt om nagelbeschadiging te voorkomen door de nagels te versterken.
- ✓ **Gebruik van koeling**: Tijdens de toediening van de chemotherapie zal u ijskoeling krijgen aan de handen en voeten. Door de koude vernauwen de bloedvaten in handen/voeten. Zo kan de chemotherapie niet tot in uw vingertoppen en tenen komen en hebt u minder kans op beschadiging van uw nagels.



Extra info omgaan met uitscheiding

- ✓ Uw uitscheiding (urine, ontlasting, wondvocht, bloed, traanvocht, transpiratie, sperma, en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten.

Enkele tips:

- ✓ Urine: zittend plassen, toilet tweemaal doortrekken met deksel naar beneden
- ✓ Sperma/ vaginaal vocht: gebruik van condoom bij betrekkingen
- ✓ Braaksel: zelf opruimen of naasten laten opruimen met handschoenen



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je te **veel last** ondervindt van bovenvermelde **nevenwerkingen**
- ✓ Bij tekenen van **infectie**: koorts boven 38°C, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde **bloedingen**
- ✓ Dringende **vragen** over uw therapie