

Pemetrexed (Alimta®)



Uw therapie bestaat uit een celremmend geneesmiddel (cytostatica). Deze therapie kan gebruikt worden in combinatie met andere chemotherapie. Daarnaast kan uw arts nog enkele andere geneesmiddelen voorschrijven. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.



U zal deze therapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. Pemetrexed wordt 3 wekelijks toegediend.

Eén cyclus duurt 21 dagen en omvat één ambulante opname voor therapie. Dag één is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus.



Richtlijnen:

- ✓ We raden u aan om voldoende te drinken (1,5 tot 2 liter per dag) tijdens en tot 48 uur na de chemotherapie toedieningen, Zo kan u alle schadelijke stoffen uitplassen.
- ✓ Gebruik steeds beschermende kledij, een hoofddeksel en een zonnecrème met hoge beschermingsfactor.



Mogelijke interacties:

- ✓ Alcohol: vermijd alcohol gedurende 1 dag voor en tot en met 2 dagen na de therapie.
- ✓ Pompoelmoes, granaatappel en sterfruit vermijden.
- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan uw arts.



Mogelijke bijwerkingen

- ✓ Remming van de aanmaak van bloedcellen: hierdoor verhoogde kans voor infecties, bloedarmoede, bloedingen (vb: sneller blauwe plekken, bloedneus, bloed in urine of stoelgang).
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Verminderde eetlust
- ✓ Tijdelijke reuk- en smaakveranderingen
- ✓ Mondslijmvliesontstekingen (bv. aften)
- ✓ Buikloop of diarree
- ✓ Ongewone vermoeidheid
- ✓ Bijwerkingen ten gevolge van inname van corticosteroïden
- ✓ Invloed op seksualiteit en intimiteit



Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (urine, ontlasting, wondvocht, bloed, traanvocht, transpiratie, sperma en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten. Enkele **tips**:

- ✓ Urine: zittend plassen, wc tweemaal doorspoelen met deksel gesloten
- ✓ Sperma / vaginaal vocht: gebruik van condoom bij intiem contact.
- ✓ Braaksel: draag handschoenen bij het opruimen



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als u veel last heeft van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Bij nieuwe of verergerde longklachten, zoals moeite met ademen, kortademigheid of hoesten met of zonder slijm, of koorts
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts boven 38°, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde bloedingen
- ✓ Dringende vragen over uw therapie



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie: