



Patiënteninformatie

Het toedienen van Kalinox® bij kinderen



Inleiding

Omdat we de kwaliteit van zorg voor uw kind zo hoog mogelijk willen houden, heeft het recht op een maximale pijnbestrijding of op het voorkomen van pijn.

Om uw kind minder pijn te laten ervaren tijdens een onderzoek of behandeling, kunnen we gebruikmaken van een lichte verdoving: Kalinox®. Dit is een pijnstillend gas dat wordt ingeademd via een maskertje. Uw kind blijft bij bewustzijn en u kunt er ook tegen blijven praten.

De voordelen van Kalinox® voor uw kind:

- 👉 pijn en angst worden verminderd tijdens de medisch/verpleegkundige handeling;
- 👉 angstreacties voor herhaaldelijke medisch/verpleegkundige handelingen worden voorkomen.

De arts en de verpleegkundige leggen u de procedure stap voor stap uit. Als uw kind 5 minuten na de start van het toedienen van het gas niet rustig wordt, dan stoppen we de procedure. Deze folder zet alle info nog eens kort en bondig op een rijtje.

Wat kunt u doen als ouder?

U mag als ouder aanwezig zijn tijdens het onderzoek of de behandeling, tenzij u zwanger bent. Tijdens het onderzoek kunt u mee zorgen voor uw kind. Het zal zich beter voelen wanneer u in de buurt bent en u weet ook het best hoe u uw kind kunt afleiden tijdens het onderzoek.

Vorbereiding

De verpleegkundige zal vooraf uw kind leren hoe het goed kan blazen in het masker.

Om te voorkomen dat uw kind het onderzoek bewust beleeft en om het effect van Kalinox® zo groot mogelijk te maken, starten we onze handeling pas nadat uw kind het gas 3 minuten ingeademd heeft. De verpleegkundige begeleidt u en uw kind bij elke stap.

Uit veiligheid leggen we uw kind aan een monitor. Zo kunnen we alles goed opvolgen.

Uitvoering

Nadat uw kind het gas 3 minuten heeft ingeademd, start het onderzoek of de behandeling. U kunt de hele tijd rustig blijven praten tegen uw kind. De verpleegkundige blijft uw kind observeren op eventuele tekenen van pijn.

Volgende effecten van het gas kunt u opmerken bij uw kind, maar ze hoeven niet noodzakelijk op te treden:

-  ontspanning;
-  soms lachaanvallen;
-  verminderde gevoeligheid (een kind voelt soms de prik, maar ervaart het niet als onaangenaam);
-  geheugenverlies van het onderzoek zelf;
-  uw kind kan u horen, maar het lijkt voor hem/ haar alsof u in de kamer ernaast staat.

Meteen na het onderzoek stoppen we de toediening van Kalinox®.

Nazorg

Na 5 minuten stoppen we de monitor. De effecten van het gas zijn dan immers uitgewerkt. Uw kind reageert dan opnieuw zoals voordien. We laten uw kind niet alleen of we zorgen ervoor dat de hekken van het bed gesloten zijn. Nadien laten we uw kind even rechtop zitten alvorens het te laten rechtstaan. Uw kind mag onmiddellijk eten en de activiteiten hervatten.

Tot slot

Hebt u nog vragen na het lezen van deze folder? Aarzel dan niet om uw arts of verpleegkundige aan te spreken.

Alle informatie over de dienst kindergeneeskunde, de kinderafdeling en het kinderdagziekenhuis vind je op www.azturnhout.be/kinderen.

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11



V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw • Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout