



Patiënten informatie

Flaminal Hydro[®] bij mond- en keelbestraling

Centrum voor oncologie
Radiotherapie

Inhoud

Inhoud.....	2
Inleiding	3
Omschrijving en doel van de behandeling.....	3
Huidreactie	3
Wat is Flaminal hydro®?	3
Waarvoor wordt het gebruikt?.....	3
Vorbereiding op de behandeling.....	4
Verloop van de behandeling.....	4
Tijdens de bestralingsperiode	4
Vóór u naar de bestraling komt	4
Na de dagelijkse bestraling (maandag – vrijdag).....	5
Verbandwissel in het weekend (geen bestraling)	6
Na de bestralingsperiode.....	6
Praktische aanpak.....	6
Tot slot.....	7
Persoonlijke notities/ vragen	7

AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Inleiding

Deze brochure biedt u informatie over het gebruik van Flaminal Hydro[®] bij mond- en keelbestralingen. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Breng deze brochure mee als u naar het ziekenhuis komt.

Omschrijving en doel van de behandeling

Huidreactie

Tijdens de bestraling kan u last krijgen van een ernstige huidreactie, bijvoorbeeld:

- vochtige huidletsels
- ernstige roodheid
- vochtophoping (oedeem)
- pijn

Uw arts of verpleegkundige zal u uitleggen hoe u de wond moet verzorgen. We stellen voor om Flaminal Hydro[®] te gebruiken en we leggen uit hoe u deze zalf moet gebruiken.

Wat is Flaminal hydro[®]?

Flaminal Hydro[®] zorgt ervoor dat een wonde sneller zal genezen doordat het de wonde zuiver en vochtig houdt. Flaminal Hydro[®] herstelt het bacterieel evenwicht en beschermt de wondranden waardoor de wonde beter kan dichtgroeien.

Waarvoor wordt het gebruikt?

Bij oppervlakkige, ondiepe of diepe wonden die droog of matig vochtig zijn.

Vorbereiding op de behandeling

De verpleegkundige heeft bij u de eerste wondzorg uitgevoerd. Deze wondzorg is complexer en het is belangrijk om deze nauwkeurig uit te voeren.

Als het niet mogelijk is om zelf uw wond te verzorgen, vraag dan hulp aan uw partner, familie, vrienden, buren,... (een mantelzorger). Als u geen mantelzorger heeft, dan raden wij u aan om een thuisverpleegkundige te laten komen voor de wondverzorging.

Verloop van de behandeling

Tijdens de bestralingsperiode

Vóór u naar de bestraling komt

- Verwijder de vuile compressen maar laat het Mepitel one[®] verband ter plaatse of leg het weg op een proper oppervlak om het later terug te kunnen gebruiken. (Mepitel one[®] kan tot 5 dagen gebruikt worden)
- Reinig de wonde met Prontosan[®]: leg een kompres gedrenkt met Prontosan[®] op de wonde. Laat dit 15 minuten inwerken.
- Na 15 minuten neemt u het kompres van de wonde en u zult merken dat het vuil van de wonde aan het kompres hangt. Dep eventueel de wonde voorzichtig droog met een proper kompres.
- Plaats een Mepilex[®] verband op de wonde en bevestig dit met Tubifast[®], Surgifix[®] of een windel.
- Zo komt u naar de bestraling.
- Het Mepilex[®] verband wordt vóór de bestraling door de verpleegkundige verwijderd.

Na de dagelijkse bestraling (maandag – vrijdag)

- U doet het Mepilex[®] verband terug op de wonde. Nadien gaat u naar huis voor de wondzorg.
- Verzorg uw wond 1x per dag, telkens na de bestraling.

Als u de wonde zelf verzorgt

- Neem plaats op een stoel voor de spiegel.
- Verwijder het Mepilex[®] verband.
- Breng de Flaminal Hydro[®] aan op de wonde en verspreidt dit met een kompres over het wondoppervlak, niet op de wondranden. Hierop brengt u het Mepitel one[®] verband aan (dit moet groter zijn dan de wonde, het voorkomt inkleven).
- Dek nu af met een Melolin[®] verband.
- Bevestig dit met een Tubifast[®], Surgifix[®] of een windel.

Als de wonde wordt verzorgd door een mantelzorgverpleegkundige of een thuisverpleegkundige

- De patiënt neemt een liggende houding aan (ruglig).
- Verwijder het Mepilex[®] verband.
- Breng de Flaminal Hydro[®] aan op de wonde (0,5 cm dik), niet op de wondranden. Hierop brengt u het Mepitel one[®] verband aan (dit verband moet groter zijn dan de wonde).
- Dek nu af met een Melolin[®] verband.
- Bevestig met een Tubifast[®], Surgifix[®] of een windel.

Verbandwissel in het weekend (geen bestraling)

- Wissel het verband elke dag bij fibrineuze (gele) wonden.
- Wissel het verband om de 2 dagen bij een granulerende (rode) wonde.

Na de bestralingsperiode

- Na het einde van de bestraling moet het verband elke dag worden gewisseld bij fibrineuze (gele) wonden en om de 2 dagen bij het een granulerende (rode) wonde.

1 week na de bestraling controleren we de wonde opnieuw. De laatste dag van de bestraling maken we hiervoor een afspraak. Het is belangrijk dat u de zalf en het materiaal voor de wondzorg zelf meebrengt naar die controle. Anders gebruiken we materiaal uit het ziekenhuis en moeten we de kosten aanrekenen op uw ziekenhuisfactuur.

- De verpleegkundige controleert de wonde en geeft u verdere instructies.

Praktische aanpak

Als we beslissen om te starten met Flaminal Hydro[®] dan krijgt u van de verpleegkundige de nodige producten mee.

Het is belangrijk om ons op tijd te laten weten wanneer één van de producten bijna op is. Wacht niet tot het product volledig op is. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u op tijd een nieuw product krijgt.

Flaminal Hydro[®] mag u niet in de koelkast bewaren.

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout