

Inlyta® (axitinib)



Inlyta®, met axitinib als werkzame stof, wordt gebruikt bij de behandeling van een soort nierkanker, **niercelcarcinoom**, met uitzaaiingen naar andere delen van het lichaam.



Inlyta® bindt in kankercellen aan een specifieke receptor, de zogenaamde vasculaire endotheel groeifactor receptor (VEGF-receptor), om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Er bestaan 2 soorten Inlyta® tabletten: tabletten met 1 mg en 5 mg axitinib. De aanbevolen **dagelijks dosis** is **5 mg tweemaal per dag**. Afhankelijk van hoe je reageert op de behandeling kan de arts in overleg met jou de dosis aanpassen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem de aanbevolen dosis in **op een vast tijdstip, tweemaal per dag** met een glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tabletten Inlyta® ... mg per keer, tweemaal per dag

Zorg dat er ongeveer 12 uur zit tussen de twee innames.



Neem Inlyta® **ALTIJD MET of ALTIJD ZONDER voedsel** in. Als je kiest voor een inname met voedsel, neem je best een licht verteerbare, weinig vette maaltijd. Als je kiest voor een inname zonder voedsel, doe je dit telkens ten minste 1 uur vóór het eten of 2 uur na het eten.

Slik de tabletten **in hun geheel** door. Je mag de tabletten niet breken, fijnmalen of erop kauwen.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tabletten in te halen.

Bij **braken na inname** de dosis niet herhalen, maar de volgende dosis innemen volgens het gebruikelijke schema.



Tijdens een behandeling met Inlyta® is het **gebruik** van **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** en producten op basis van **Sint-Janskruid** ten sterkste **afgeraden**.

Als je tijdens je behandeling met Inlyta® nog **andere medicatie, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Inlyta® kan de werking van je lever, nieren, hart en schildklier beïnvloeden zonder dat je hiervan iets merkt. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om de werking van deze organen te controleren. De arts zal ook je bloeddruk en hartritme opvolgen.



Als je je duizelig of vermoeid voelt door de behandeling met Inlyta®, wees dan bijzonder voorzichtig wanneer je een voertuig bestuurt of een machine gebruikt.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Inlyta® bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- | | |
|---|--|
| ✓ Hoofdpijn | ✓ Hoge bloeddruk |
| ✓ Kortademigheid en hoesten | ✓ Huiduitslag (rash) en een droge huid |
| ✓ Abnormale smaak in de mond, verminderde eetlust | ✓ Bloedingen |
| ✓ Buikpijn, misselijkheid en braken | ✓ Vermoeidheid en algemene zwakte |
| ✓ Diarree of moeilijke stoelgang | ✓ Gewrichtspijn, pijn in de handen of voeten |
| ✓ Gewichtsverlies | ✓ Schildklierafwijkingen (gezien in bloedafname) |
| ✓ Mondslijmvliesontsteking (pijn en blaasjes of zweertjes in de mond) | ✓ Eiwit in de urine (gezien in urinetesten) |



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Inlyta® genomen hebt
- ✓ Als je pijn of druk op de borst voelt of een zwak of doof gevoel hebt aan één kant van het lichaam
- ✓ Bij overmatige vermoeidheid, kortademigheid, snelle gewichtstoename en/of gezwollen voeten, enkels of benen
- ✓ Als je zwarte teerachtige ontlasting hebt of bloed of bloederig slijm ophoest
- ✓ Als je ernstige buikpijn of hoofdpijn hebt
- ✓ Als je verwacht bent, epileptische aanvallen of verandering in gezichtvermogen heeft



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
014 40 60 81: klinisch apotheker
014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum 08/07/2025