

Dasatinib Teva® - volwassenen



Dasatinib Teva® wordt gebruikt om **chronische myeloïde leukemie (CML)** en **acute lymfatische leukemie (ALL)** te behandelen. Leukemie is een kanker van de witte bloedcellen. Bij CML beginnen granulocyten, bepaalde witte bloedcellen, ongecontroleerd te groeien. Bij ALL vermenigvuldigen lymfocyten, andere witte bloedcellen, zich te snel en leven te lang.



Dasatinib Teva® bindt in kankercellen aan specifieke eiwitten, de zogenaamde proteïnekinasen, om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor afsterven.



Er bestaan 4 soorten Dasatinib Teva® **tabletten**: tabletten met 20 mg, 50 mg, 70 mg en 100 mg dasatinib. De aanbevolen dagelijkse dosis voor CML in de chronische fase is 100 mg. De aanbevolen dagelijkse dosis bij CML in de acceleratie of blastaire fase en bij Ph+ALL is 140 mg. Afhankelijk van hoe je reageert op de behandeling met Dasatinib Teva® kan de arts in overleg met jou de dosis aanpassen of de behandeling tijdelijk onderbreken.



Neem **eenmaal per dag** op een vast tijdstip de aanbevolen hoeveelheid met een half glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tablet(ten) Dasatinib Teva® ... mg



Neem Dasatinib Teva® **ALTIJD MET voedsel** of **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Als je kiest voor inname met voedsel, neem je best een licht verteerbare, weinig vette maaltijd. Als je kiest voor inname zonder voedsel, neem je dit telkens ten minste 1 uur vóór het eten of 2 uur na het eten. Slik de **tabletten** in hun geheel door. Je mag de tabletten niet breken of fijn maken.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten dosis in te halen.



Tijdens een behandeling met Dasatinib Teva® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** of producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Dasatinib Teva® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Dasatinib Teva® kan de samenstelling van je bloed verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. het aantal bloedcellen te controleren. De arts zal ook je hart- en longfunctie opvolgen.



Als je je duizelig voelt of wazig ziet door de behandeling met Dasatinib Teva®, wees dan bijzonder voorzichtig wanneer je een voertuig bestuurt of een machine gebruikt.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Dasatinib Teva® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Verminderd aantal witte bloedcellen met verhoogd risico op infecties tot gevolg
- ✓ Verminderd aantal bloedplaatjes met verhoogd risico op bloedingen en blauwe plekken tot gevolg
- ✓ Verminderd aantal rode bloedcellen met vermoeidheid en zwakte tot gevolg
- ✓ Hoofdpijn
- ✓ Koorts
- ✓ Huiduitslag (rash)
- ✓ Misselijkheid, braken, buikpijn, diarree
- ✓ Kortademigheid, vermoeidheid en zwakte
- ✓ Vochtophoping in het gezicht, handen, enkels of voeten (oedeem)
- ✓ Spierpijn



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Dasatinib Teva® hebt ingenomen
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts ($\geq 38,3^\circ \text{C}$), koude rillingen, pijnlijke keel of zweren in de mond, blaren of afschilfering van de huid/of slijmvlies, ademhalingsproblemen of een piepende ademhaling,...
- ✓ Bij bloed in braaksel, in de ontlasting of de urine, bij zwarte ontlasting, bij onverwachte bloedingen of blauwe plekken (zonder vallen of stoten)
- ✓ Bij vermoeidheid en verwardheid
- ✓ Bij kortademigheid, droge hoest, pijn op borst, flauwvallen



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
 014 40 60 70: apotheek
 014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versie 17/07/2025