

Casodex® en generieken (bicalutamide)



Casodex® met bicalutamide als werkzame stof, wordt gebruikt om **prostaatkanker** te behandelen. **Casodex 50** wordt gebruikt bij gevorderde prostaatkanker nadat de teelballen chirurgisch verwijderd zijn (chirurgische castratie) of in combinatie met een andere hormonale therapie, namelijk androgeendeprivatietherapie die via injectie of implantaat wordt toegediend (chemische castratie). **Casodex 150** wordt gebruikt bij lokaal gevorderde prostaatkanker met een hoog risico op verergering van de ziekte. Casodex 150 kan alleen toegediend worden of als adjuvante behandeling (aanvullend na eerstelijnsbehandeling) na een prostatectomie (verwijdering van prostaat) of bestraling.



Casodex® **verhindert de werking van het hormoon testosteron** in het lichaam. De groei van de prostaatkankercellen is afhankelijk van testosteron. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor afsterven.



Er bestaan 2 soorten Casodex® tabletten: tabletten met 50 mg en 150 mg bicalutamide. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **50 mg of 150 mg**, afhankelijk van de aandoening. De behandeling met Casodex® kan gecombineerd worden met **een behandeling die de testosteronspiegel verlaagt** (d.i. androgeendeprivatietherapie). Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen, kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem de aanbevolen hoeveelheid in **op een vast tijdstip éénmaal per dag** met een half glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tablet(ten) Casodex® ... mg



Neem Casodex® **ALTIJD MET of ALTIJD ZONDER voedsel** in. Als je kiest voor inname met voedsel, neem Casodex® dan bij een lichte, geen te vette maaltijd. Als je kiest voor inname zonder voedsel, neem Casodex® dan ten minste 1 uur vóór of 2 uur na het eten. Slik de tabletten **in hun geheel** door met een **half glas water**. Je mag de tabletten **niet breken, niet fijnmalen** of erop **kauwen**. Als je de tabletten niet in hun geheel kan doorslikken, vertel dit dan aan je arts.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tabletten in te halen.



Casodex® kan een wisselwerking geven met verschillende middelen zoals warfarine, amiodarone, bepaalde bloedverduunners,... Daarom is het belangrijk dat als je tijdens je behandeling met Casodex® nog **andere medicatie, homeopathische middelen, kruiden of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, dit te melden aan je arts of apotheker.



Casodex® kan een invloed hebben op de leverfunctie en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. de leverfunctie te controleren.



- Verlaagd libido en erectiestoornissen kunnen optreden tijdens een behandeling met Casodex®. Bij vruchtbare mannen moet er dus rekening gehouden worden met een periode van **verminderde vruchtbaarheid** of onvruchtbaarheid.
- Tijdens de behandeling en tot 130 dagen erna dienen jij en je partner zeer effectieve **anticonceptie** te gebruiken.
- Als je je ongewoon moe of duizelig voelt door de behandeling met Casodex®, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Casodex® bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):



- ✓ Misselijkheid, braken, obstipatie
- ✓ Duizeligheid
- ✓ Slaperigheid
- ✓ Opzetting van de borsten en gevoeligheid van de tepels
- ✓ Warmteopwellingen
- ✓ Bloed in de urine
- ✓ Vermoeidheid en algemeen zwaktegevoel
- ✓ Vochtophoping (oedeem)
- ✓ Huiduitslag (rash)
- ✓ Bloedarmoede (anemie)

Contacteer het behandelend team:



- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Casodex® hebt genomen
- ✓ Als je hartkloppingen of een onregelmatige of versnelde hartslag ervaart
- ✓ Bij kortademigheid, snelle gewichtstoename en/of gezwollen voeten, enkels of benen
- ✓ Als je merkt dat je huid of ogen geel worden, je urine donkerder wordt of als je erg misselijk bent of moet braken. Dit kunnen tekenen zijn van leverproblemen.



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.

