

Folfiri



Deze therapie bestaat uit twee **celremmende geneesmiddelen: Irinotecan en Fluorouracil**. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden zoals folinaat. Folinaat is geen chemotherapie, maar zorgt ervoor dat Fluorouracil beter opgenomen wordt in uw lichaam en zo de werking versterkt.



Deze behandeling kan in het **dagziekenhuis** gebeuren. Eén cyclus duurt 14 dagen (twee weken). Voor en na elk product wordt er gespoeld met fysiologisch water via een baxter.

- **Folinaat:** Dit infuus loopt over 30 min
- **Irinotecan:** Dit infuus loopt over 90 min
- **Fluorouracil:** Dit infuus loopt tien minuten
- **Fluorouracil pompje:** Dit pompje loopt 48 uur en zal u mee naar huis kunnen nemen. Op dag 3 zal een thuisverpleegkundige het pompje afkoppelen.

Mogelijke interacties



- Alcohol: gedurende 1 dag voor en 2 dagen na de therapie alcohol vermijden
- Pompoelmoes, granaatappel of sterfruit
- Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts.
- U moet 1,5-2 liter drinken per dag tijdens deze toediening.



Mogelijke bijwerkingen

- Remming van de aanmaak van bloedcellen: hierdoor verhoogde kans voor infecties, bloedarmoede, bloedingen (vb: sneller blauwe plekken, een bloedneus, bloed in urine of stoelgang).
- Maag-darm klachten: verminderde eetlust, misselijkheid en braken
- Diarree: hiervoor krijgt u een subcutane inspuiting
- Mondslijmvliesontstekingen
- Licht haarverlies
- Vermoeidheid
- Tijdelijke smaak en geurverandering
- Hand voet-syndroom
- Vruchtbaarheidsproblemen, vaginale droogte



Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (zoals: urine, ontlasting, wondvocht, traanvocht, transpiratie, sperma en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten. Enkele tips:

- Urine: zittend plassen, toilet tweemaal doorspoelen
- Sperma / vaginaal vocht: gebruik van condoom bij het vrijen
- Braaksel: draag handschoenen bij het opruimen



Contacteer het behandelend team:

- Als u veel last heeft van bovenvermelde nevenwerkingen
- Bij nieuwe of verergerde longklachten, zoals moeite met ademen, kortademigheid of hoesten met of zonder slijm, of koorts
- Bij tekenen van infectie: koorts boven 38°, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- Bij ongecontroleerde bloedingen
- Dringende vragen over uw therapie