

Nubeqa® (darolutamide)



Nubeqa® met darolutamide als werkzame stof, wordt gebruikt om **prostaatkanker** te behandelen bij volwassen mannen bij wie de prostaatkanker zich niet naar andere delen van het lichaam verspreid heeft en bij wie de prostaatkanker niet meer reageert op medicamenteuze of chirurgische behandeling die het testosterongehalte verlaagt (castratieresistente prostaatkanker). Het wordt ook gebruikt bij een hormoongevoelige prostaatkanker die zich wel al naar andere delen van het lichaam verspreid heeft, in combinatie met docetaxel en androgeendeprivatietherapie (ADT).



Nubeqa® **verhindert de werking van het hormoon testosteron** in het lichaam. De groei van de prostaatkankercellen is afhankelijk van testosteron. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor afsterven.



Nubeqa® bestaat in tabletten van 300 mg. De **aanbevolen dosis is 600 mg (2 tabletten van 300mg), tweemaal per dag**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen, kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **tweemaal per dag, op een vast tijdstip** de aanbevolen hoeveelheid in met een glas water. Zorg dat er ongeveer 12 uur zit tussen de twee innames.

Dagelijkse dosis: mg = ... tablet(ten) Nubeqa® 300 mg per keer, tweemaal per dag



Neem Nubeqa® steeds in bij de maaltijd. Slik de tabletten **in hun geheel** door met een **half glas water**. Je mag de tabletten **niet breken, niet fijnmalen** of erop **kauwen**. Als je de tabletten niet in hun geheel kan doorslikken, vertel dit dan aan je arts.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan je overgeslagen dosis in zodra je eraan denkt als dit voor de volgende geplande dosis is. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tabletten in te halen.



Nubeqa® kan een wisselwerking geven met verschillende middelen zoals bij geneesmiddelen gebruikt bij infecties (rifampicine), epilepsie (carbamazepine, fenytoïne), cholesterolmedicatie (rosuvastatine),... Daarom is het belangrijk dat als je tijdens je behandeling met Nubeqa® nog **andere medicatie, homeopathische middelen, kruiden (sint-janskruid) of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, dit te melden aan je arts of apotheker.

Nubeqa® bevat **lactose**, indien je bepaalde suikers niet verdraagt, meld dit dan aan je arts of apotheker voordat je dit geneesmiddel inneemt.



Nubeqa® kan een invloed hebben op de bloedwaarden en leverfunctie. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. de bloedwaarden en de leverfunctie te controleren.



- Tijdens de behandeling en tot 7 dagen erna dienen jij en je partner zeer effectieve **anticonceptie** te gebruiken.
- Spoel dit geneesmiddel niet door de gootsteen of de WC en gooi niet in de vuilbak. Vraag uw apotheker wat u met de geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Nubeqa® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):



- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Malaise
- ✓ Huiduitslag (rash)
- ✓ Verhoogde bloeddruk
- ✓ Misselijkheid
- ✓ Gebrek aan energie, lichamszwakte
- ✓ Afwijkende bloedwaarden: verhoogde leverwaarden en verlaagd aantal witte bloedcellen

Contacteer het behandelend team :



- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Nubeqa® hebt ingenomen
- ✓ Als je hartkloppingen of een onregelmatige of versnelde hartslag ervaart
- ✓ Bij kortademigheid, snelle gewichtstoename en/of gezwollen voeten, enkels of benen
- ✓ Als je merkt dat je huid of ogen geel worden, je urine donkerder wordt of als je erg misselijk bent of moet braken. Dit kunnen tekenen zijn van leverproblemen.

Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
 014 40 60 81: klinisch apotheker
 014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum 08/07/2025